



Übungsblatt 7 Abgabe bis 24.06.2024 vor der Übung

Vorname, Name:

1. Zur Berechnung des elektronischen Übergangs von $n=1$ nach $n=2$ in einem Molekül mit konjugierten Doppelbindungen kann man die Schrödingergleichung für den eindimensionalen Fall anwenden:

$$E_n = \frac{h^2 n^2}{8m_e a^2} \quad \text{wobei } h = 6.626 \cdot 10^{-34} \text{ Js ; } m_e = 9.1095 \cdot 10^{-31} \text{ kg ; } (1 \text{ J} = 1 \text{ kg m}^2 \text{ s}^{-2})$$

$a = \text{Kastellänge} = \text{Moleküllänge} = 2.94 \cdot 10^{-9} \text{ m}$

Berechnen Sie die Wellenlänge λ (in Meter) für den Übergang gemäß $\Delta E = \frac{hc}{\lambda}$
mit $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m s}^{-1}$
(25 Punkte)

2. Geben Sie fünf Strukturisomere mit der Summenformel $\text{C}_4\text{H}_6\text{O}_2$ an, die der Oktettregel gehorchen.
(25 Punkte, jeweils 2 Bonuspunkte für jedes weitere, maximal 10 Bonuspunkte, maximal 100 Punkte für das Übungsblatt erreichbar)

3. Wieviel Rumpf- und Valenzelektronen haben die folgenden Molekülsysteme? (Sie benötigen ein Periodensystem) Rumpfelektronen sind die der aufgefüllten Schalen; Zusätzliche Elektronen zählen zu den Valenzelektronen.

Rumpfelektronen Valenzelektronen

H₂

CH₄

HCl

Cs⁺

PO₄³⁻


O₂²⁻

(24 Punkte)

4. a) Berechnen Sie die Energien ε_i der 5 π -Orbitale des Cyclopentadienylanions (C₅H₅⁻) in Abhängigkeit von α und β gemäß der Formel

$$\varepsilon_i = \alpha + 2\beta \cos\left(\frac{2k\pi}{N}\right) \quad ; \text{ mit } k = 0, 1, 2, \dots, N-1$$

mit N = Anzahl der Kohlenstoffatome



b) Wie viele bindende und anti-bindende π -Orbitale gibt es, und welche (Nummer) sind dies ?

Hinweis: Das System hat 6 π -Elektronen und ist aromatisch. $\alpha > 0$ und $\beta < 0$, wodurch die Energien nicht dieselbe Reihenfolge haben wie der Index i .

Benutzen für die Winkelfunktion das Bogenmaß (RAD)

(26 Punkte)